

## Lagoa de Albufeira - Ribeira da Apostiça/Ribeira da Brava



**Tipo:** Corredor Estruturante  
Secundário da Rede Ecológica  
Metropolitana

**Outras áreas da EER  
relacionadas:** Arrábida/Espichel/  
Matas de Sesimbra/Lagoa de  
Albufeira

**Concelhos:** Sesimbra

**Áreas classificadas:** Integra parcialmente Rede Natura 2000 (ZPE de Lagoa Pequena, SIC Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira)

**Descrição geral:** Estabelece a ligação entre o litoral e a área agrícola de Azeitão.

Inicia-se na Lagoa de Albufeira e segue ao longo da área agrícola de baixa aluvionar da Ribeira da Apostiça/Ribeira Brava, no território das Matas de Sesimbra, passando pelo aglomerado da Apostiça e finalizando junto ao aglomerado Pinhal Negreiro. A



lagoa de Albufeira constitui uma área lagunar de grande importância e nuclear para a conservação da natureza, assim como os sistemas dunares litorais que acompanham a linha de costa para norte e sul da lagoa.

A Lagoa é formada por dois corpos lagunares, a Lagoa Pequena e a Lagoa Grande, ligados por um canal estreito e sinuoso. A barreira natural de separação com o oceano é formada por um cordão arenoso que periodicamente é aberto ao mar de forma artificial. (PSRN 2000)

A Lagoa Pequena possui uma grande importância para a manutenção e equilíbrio do sistema lagunar já que a colonização por *Ruppia spv* e *Gracillaria sp* permite o desenvolvimento de um precioso e inestimável habitat para numerosas espécies aquáticas. Quando o nível da água não é excessivamente

alto, formam-se zonas de vasa junto às margens que são utilizadas pelas limícolas, sobretudo durante os períodos de passagem migratória) (PSRN 2000)

Os terrenos imediatamente a montante da lagoa encontram-se atualmente cobertos por Caniço, exceto nos locais onde a água é mais profunda. Este é o biótopo com maior interesse ornitológico, sendo utilizado como local de

nidificação por um conjunto de aves onde se incluem o Garçote, a Garça-vermelha, a Águia-sapeira, o Camão, o Frango-d'água ou o Rouxinol-dos-caniços. Para além disso, os caniçais são também um importante suporte para a migração de várias



espécies de passeriformes migradores. São também usados como dormitório ou refúgio por aves como os estorninhos ou as andorinhas. As zonas de água livre que se formam na sua orla e no seu interior são por sua vez utilizados pelas diferentes espécies de patos que frequentam a lagoa. (PSRN 2000)

A rodear praticamente toda a lagoa encontra-se um vasto pinhal, onde se destacam o Pinheiro-manso, o Pinheiro-bravo e alguns Eucaliptos e Sobreiros. Por vezes existe algum estrato arbustivo. Os terrenos agrícolas surgem normalmente nos terrenos de vale de cheia das ribeiras que desaguam na lagoa: ribeira de Aiana, Ferraria e Apostiça. (site da CM de Sesimbra: ver mais [aqui](#))

*Fonte das imagens: site da CM de Sesimbra*